



Профилактика инфекций

в центральном катетере (Broviac®, Port-a-Cath®, PICC), установленном вашему ребёнку


Инфекция кровотока возникает тогда, когда бактерии или микробы поступают в кровь через центральный катетер, установленный вашему ребёнку. Ваш ребёнок может сильно заболеть, если микробы попадут в кровоток.

Когда стоит беспокоиться о том, что в установленном вашему ребёнку центральном катетере возникла инфекция:

- Звоните своему врачу, если температура превышает 100.4° F или по указанию своего врача.
- Не давайте ребёнку Tylenol® или Motrin® без указания врача.
- Если на коже вокруг центрального катетера появится покраснение, отёчность, выделения, запах или боль, немедленно звоните врачу или медсестре:
() _____

Для предотвращения инфекции:

- Пожалуйста, показывайте карточку «This is My Lifeline» (Это моя линия жизни) поставщикам услуг.
- Сохраняйте повязку и все части трубок катетера в чистом и сухом состоянии.
- Перед тем, как прикасаться к катетеру, мойте руки водой с мылом или пользуйтесь спиртосодержащим дезинфектором для рук.
- Убедитесь в том, что все члены семьи и друзья моют руки до и после посещения.
- Не позволяйте никому, кто не прошёл соответствующую подготовку, заниматься уходом за центральным катетером.
- Надевайте маску во время замены повязки и колпачков центрального катетера.
- Всегда используйте чистую поверхность для расходных материалов.



**Вполне нормально сказать:
«ПОЖАЛУЙСТА, вымойте руки!»
или «Вы вымыли руки?»**

- Смените повязку, если она запачкается, намочнет, на ней появятся какие-либо выделения, или если она начнёт отклеиваться.
- Перед наложением новой повязки, кожу и ту часть катетера, которая находится под повязкой, необходимо тщательно протереть хлоргексидином. Помните, что необходимо, чтобы поверхность полностью высохла.
- Не дуйте на кожу и не обмахивайте её рукой для того, чтобы она высохла после чистки.
- Для имплантированных катетеров, катетеров Port-A-Caths® и PICC, используйте медикаментозные диски (BioPatch®).
- Для центральных венозных катетеров (Broviac®), используйте диск BIOPATCH®, если катетер установлен меньше недели назад.
- Колпачки и соединения должны тщательно протираться спиртом и полностью высохнуть. ОБА эти шага необходимы (попросите сделать это своего поставщика медицинских услуг).
- Содержите повязку и все части трубки катетера в чистом и сухом состоянии.
- Следите за тем, чтобы центральный катетер не болтался в ванной, в подгузнике ребёнка и не упал на пол.

Расходные материалы

- Храните расходные материалы в чистом и сухом месте.
- Храните расходные материалы вдали от детей и домашних питомцев.
- Не используйте расходные материалы, если упаковка уже была вскрыта или упала на пол.
- Не используйте повторно шприцы или иглы.

Для получения дополнительных копий данной брошюры, пожалуйста, посетите раздел «Patient and Family Education A-Z» (Обучение пациента и семьи от А до Я) по адресу: children.ucdavis.edu

UC DAVIS
CHILDREN'S HOSPITAL

Children's Miracle Network Hospitals partner 