


Cáncer de Cuello Uterino: Lo Que Necesita Saber

¿A qué edad hacer una prueba de detección?




El cáncer de cuello uterino es un cáncer que es prevenible y curable si es detectado en etapas tempranas.

EDAD	RECOMENDACION
20 años o menor	No es necesaria la prueba
21 a 29 años	Papanicolaou cada 3 años, sin prueba de VPH
30 a 65 años - Hable con su doctor para ver qué plan es mejor para usted	Papanicolaou solamente – cada 3 años VPH solamente – cada 5 años Papanicolaou y VPH – cada 5 años
65 y mas	No es necesaria la prueba

Detección del Cáncer de Cuello Uterino

Papanicolau (**o Pap**) y/u Virus del Papiloma Humano (**VPH**)



Síntomas Pueden Aparecer Como

*no todos experimentan síntomas



Constante dolor pélvico



Sangrado vaginal anormal



Constante dolor de espalda



Descargo vaginal anormal

¡Detección temprana salva vidas! ¡Hágase la prueba HOY!

Adaptado de la División de Prevención y Control del Cáncer 2023
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

UCDAVIS
HEALTH

COMPREHENSIVE
CANCER CENTER

Office of Community Outreach and Engagement

Generosamente apoyado por una subvención de la Fundación Bristol-Myers Squibb