

Virus del Papiloma Humano:

Lo Que Necesita Saber



Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus muy común



85% de las personas se infectarán con el VPH a lo largo de su vida



VPH incrementa el riesgo de:

6 tipos de cáncer

- Cervical
- Vulva
- Vaginal
- Pene
- Anal
- Orofaringe



Los síntomas pueden tardar años en desarrollarse mientras una persona **aún es contagiosa**

90%

La vacuna contra el VPH previene más de **90%** de los cánceres causados por el VPH.



LA VACUNACIÓN DE VPH ES PREVENCIÓN DE CÁNCER

¿Cuándo Vacunarse?

Edad al recibir la 1 ^{era} vacuna	# de vacunas	Vacuna #2	Vacuna #3
9–14 años	2 vacunas	6–12 meses después del a 1 ^{era} vacuna	No es necesaria
15–26 años	3 vacunas	1–2 meses después de la 1 ^{era} vacuna	6 meses después de la 1 ^{era} vacuna

¡Proteja a sus hijos del cáncer con la vacuna contra el VPH!

Hable con el doctor de su hijo/a para obtener más información sobre la vacuna contra el VPH y otras vacunas que su hijo/a pueda necesitar.

Adaptado de la División de Prevención y Control del Cáncer de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 2023

UC DAVIS
HEALTH

COMPREHENSIVE
CANCER CENTER

Office of Community Outreach and Engagement

Generosamente apoyado por una subvención de la Fundación Bristol-Myers Squibb