

¿POR QUÉ ESTOY TOMANDO DABIGATRÁN (PRADAXA®)?

Su médico le ha recomendado que tome el medicamento dabigatrán (PRADAXA®). Este medicamento es un anticoagulante; “anti” significa contra y “coagulant” significa coagulante, así que es un medicamento que previene los coágulos sanguíneos. A veces, a este medicamento se le llama diluyente sanguíneo. Un anticoagulante ayuda a prevenir la formación de coágulos en la sangre.

Mientras toma este medicamento, es necesario mantenerle bajo estrecha supervisión para detectar hemorragias y moretones. Su proveedor de atención médica colaborará con usted para mantenerle seguro y sano mientras toma dabigatrán (PRADAXA®). Por favor, notifíquelo a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

Entre más sepan sobre este medicamento, mejor equipo harán usted y su proveedor de atención médica. Le rogamos que se tome su tiempo para leer toda la información en este folleto.

Dabigatrán (PRADAXA®)

Lo que necesita saber



UC Davis Anticoagulation Clinic

UC Davis Anticoagulation Clinic

4860 Y Street
Suite 0400
Sacramento, CA 95817
Tel: 916-734-8158

Tel: 916-734-8158

Lunes a viernes de 8 a 4:30 (Cerrada de 12-1)

Dabigatrán (PRADAXA®)

¿CÓMO SE DEBE TOMAR EL DABIGATRÁN (PRADAXA®)?

- Tome su medicamento exactamente como se le recete. Tome el dabigatrán (PRADAXA®) dos veces al día según se lo indique su médico.
- Tráguese las cápsulas enteras. NO LAS ABRA, ROMPA ni MASTIQUE.
- Guarde las cápsulas en el frasco original o en los paquetes de burbujas originales. NO LAS PONGA EN PASTILLEROS.
- Si olvida tomar una dosis, tómese la en cuanto lo recuerde. No se tome la dosis que se le olvidó si necesita tomarse su próxima dosis en las próximas seis horas.
- Nunca se tome dos dosis juntas.

¿PUEDO TOMAR DABIGATRÁN (PRADAXA®) CON OTROS MEDICAMENTOS?

Es importante hablar con su médico o farmacéutico acerca de todos los demás medicamentos que esté tomando, incluidos los medicamentos de venta libre, los antibióticos, las vitaminas o los suplementos de hierbas.

Podría tener mayor riesgo de hemorragia si toma otros medicamentos como:

- aspirina o productos que contengan aspirina.
- medicamentos antiinflamatorios no esteroides (NSAIDS): ibuprofeno (ADVIL®) o naproxén (ALEVE®).
- otro medicamento para ayudar a prevenir los coágulos sanguíneos como la warfarina (COUMADIN®) o el clopidogrel (PLAVIX®).

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DEL DABIGATRÁN (PRADAXA®)?

- indigestión, malestar estomacal o ardor.
- dolor estomacal.
- pequeños moretones.
- ligero sangrado de las encías al cepillarse los dientes.
- sangrado ocasional de la nariz.
- sangrado después de una cortadura menor que para en unos minutos.

¿CUÁNDO DEBO COMUNICARME CON MI PROVEEDOR MÉDICO PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA?

Si está sintiendo algo anormal que usted piensa que podría estar causado por el dabigatrán (PRADAXA®), por favor comuníquese con su proveedor de atención médica.

Algunas cosas a las que debe estar alerta incluyen:

- hemorragia mayor.
- orina de color rojo, oscuro o café.
- heces de color rojo o alquitranado.
- hemorragia que no para después de 10 minutos.
- vómito que es de color café o rojo brillante.
- una fuerte caída o un golpe en la cabeza.

(NOTE: the highlighted entries are the same)

Otras inquietudes podrían incluir:

- dolor inesperado, hinchazón o dolor en las articulaciones.
- dolores de cabeza o debilidad y mareos.
- una fuerte caída o un golpe en la cabeza.
- si está embarazada o planea quedar embarazada.

SI SUFRE ALGUNA HEMORRAGIA MAYOR COMUNÍQUESE DE INMEDIATO CON SU MÉDICO O ACUDA A LA SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL

¿PUEDO DEJAR DE TOMAR DABIGATRÁN (PRADAXA®)?

No deje de tomar dabigatrán (PRADAXA®) salvo que su proveedor de atención médica le diga que lo haga.

Dejar de tomar este medicamento podría aumentar su riesgo de tener un coágulo sanguíneo.

El dabigatrán (PRADAXA®) posiblemente necesite dejarse de tomar antes de un procedimiento o cirugía. Pídale a su proveedor instrucciones específicas sobre cuándo dejar de tomar el medicamento y cuando volver a tomárselo.

Si desea o necesita dejar de tomar este medicamento por cualquier razón, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica antes de dejar de hacerlo.

¿NECESITARÉ UN ANÁLISIS DE SANGRE REGULAR?

Es posible que su proveedor de atención médica realice análisis de sangre antes de iniciar el medicamento para que le ayuden a encontrar la dosis correcta.

Necesitará realizarse estos análisis de sangre por lo menos una vez al año.

El dabigatrán (PRADAXA®) no requiere el control mensual de sangre como algunos otros anticoagulantes.

¿NECESITO CAMBIAR MI DIETA?

No hay restricciones dietéticas que considerar mientras toma dabigatrán (PRADAXA®).